

Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro



## INSETTICIDI E LARVICIDI

### LINEA

# IMPACT GEL FORMICHE

ESCA INSETTICIDA IN GEL PRONTA ALL'USO DA APPLICARE IN GOCCE

## CARATTERISTICHE

**VICTOR GEL FORMICHE** è un insetticida in formulazione gel efficace contro formiche comuni e tropicali, tra le quali formica nera (*Lasius niger*), formica argentina (*Linepithema humile*) e formica faraone (*Monomorium pharaonis*). Il prodotto può essere utilizzato in interni (abitazioni private e/o edifici pubblici, di carattere residenziale, commerciale, industriale) ed intorno ad edifici (perimetro di edifici, terrazze e giardini privati). Il prodotto può essere applicato utilizzando cartucce/siringhe per il controllo delle tre specie di formiche sopracitate. Per il controllo della formica argentina, il prodotto può essere posto all'interno di stazioni di adescamento.

**VICTOR GEL FORMICHE** può portare all'eradicazione dell'intera colonia: il suo effetto ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall'ingestione, consente alle formiche operaie di trasferire il prodotto agli altri individui presenti del nido, comprese regine e larve, attraverso il particolare fenomeno denominato *Trofallassi*, che prevede la condivisione di cibo tra individui della stessa colonia.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti Civili, Aree Verdi, Ho.re.ca., Industria, Industria Alimentare, Mezzi di trasporto, Ospedali

Aut. Biocida: IT/2017/00442/MRP - VictorGelFormiche

Biocida

## INFESTANTI TARGET

Formiche comuni e tropicali

## COMPOSIZIONE

Imidacloprid puro: 0,01%

## DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

L'area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per determinare l'estensione dell'infestazione. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Rimuovere dalle aree limitrofe eventuali fonti alimentari alternative raggiungibili dalle formiche.

**VICTOR GEL FORMICHE** deve essere applicato in piccole gocce o in alternativa formando sottili linee nelle aree in cui le formiche sono presenti, in prossimità dei nidi, presso i loro percorsi o in crepe e fessure. Per utilizzo in esterni (terrazze, pati, cortili o giardini), il prodotto va applicato nei posti di maggiore presenza: cornicioni e nei punti di entrata di cavi.

Si consiglia di lavarsi le mani prima di utilizzare l'esca, per evitare contaminazioni con odori sgradevoli come tabacco, ecc... Nessuna spruzzatura o nebulizzazione di prodotti chimici vicino aree trattate, possono contaminare e rendere inappetenti per le formiche. Non applicare su legno o superfici porose. Nel caso in cui non sia possibile, applicare il prodotto su un foglio di plastica.

**DOSE:** 0.2 g/m<sup>2</sup> (corrispondenti a una goccia / una linea sottile di 3 cm di lunghezza)

**Frequenza di applicazione:** dopo 7 giorni dall'applicazione, ispezionare il punto di trattamento e ricollocare l'esca se consumata.

## PZ/CARTONE

4 SIRINGHE 35 g x 14 pz